

APHINITY**Bivirkningsark**

Danish Breast Cancer Cooperative Group

Vejledning: Vi vil gerne bede dig om at udfylde dette skema ved at slå en ring om det svar der passer bedst til hvordan du har haft det i forbindelse med den seneste behandling. Vi vil bede dig om at udfylde skemaet dagen før du skal have den næste behandling. Aflever skemaet til lægen eller sygeplejersken.

Navn: _____

Dato: _____

Patient nummer : _____

Serie: _____

Bivirkninger (NCI-CTCAE, version 4.0)

Grad	0	1	2	3	4
Slimhinde i mund og svælg	Ingen	Rødme eller sår som ikke er ømme eller kun lidt ømme	Smertende rødmen eller sår. Kan dog spise og synke	Smertende rødmen og/eller sår. Kan ikke synke og må have væske i drop	Alvorlige sår. Må have væske og ernæring i drop. Vejtrækningsbesvær
Diarre	Ingen	Lidt, men mindre end 4 gange om dagen	4-6 gange dagligt eller diarre om natten.	7 eller flere gange pr. dag. Indlæggelse eventuelt nødvendig.	Alvorlig livstruende konsekvenser, Akut behandling under indlæggelse nødvendigt
Muskel-smerter	Ingen	Milde smerter	Moderate smerter. Påvirker ens funktion, men ikke ens daglige liv	Stærke smerter som begrænser ens funktion og daglige aktivitet	
Ledsmerter	Ingen	Milde smerter	Moderate smerter. Påvirker ens funktion, men ikke ens daglige liv	Stærke smerter som begrænser ens funktion og daglige aktivitet	
Nerve påvirkning	Ingen	Forbigående stikken/prikken i fingre /tæer	Let vedvarende stikken / prikken i fingre/tæer, der ikke påvirker daglig funktion	Vedvarende stikken/prikken i fingre /tæer, der påvirker den daglige funktion.	Vedvarende følelsesløshed i tæer/ fingre der påvirker den daglige funktion
Hududslæt Arme:____ Ben:____ Krop:____ Ansigt____	Ingen	Let udslæt mindre end 10 % af kroppen. Ingen kløe eller rødme.	Udslæt 10-30% af kroppens overflade med rødme og/eller kløe. Der kontrolleres med creme eller kløestillende midler	Udslæt på mere 30% af kroppen der vanskeligt kontrolleres med creme eller kløestillende midler.	
Negle ændringer	Ingen	Farveændring rillede / flossede negle	Delvis eller hel tab af negle. Smerter i neglebånd		
Opkastning	Ingen	En til to opkastninger i et døgn	3-5 opkastninger i et døgn	6 eller flere opkastninger i et døgn, eller behov for sondeernæring	Livstruende konsekvenser akut behandling nødvendigt
Kvalme	Ingen	Tab af appetit uden ændring i spisevaner	Føde indtagelse formindsket uden væsentlige væggtab, dehydrering eller underernæring	Utilstrækkelig indtagelse af næringsstoffer eller væske hvor der er behov indlæggelse	
Træthed	Ingen	Let træthed som lindres ved hvile	Træthed der ikke lettes ved hvile, påvirker daglig funktion	Træthed der ikke lindres ved hvile. Begrænsning af daglig funktion	
Væske ophobning	Ingen	Let væskeophobning, ikke behandlingskrævende	Væskeophobning der kræver behandling	Væskeophobning der influerer på funktionsniveau og behandling ikke er tilstrækkelig	
Feber	Ingen	Temperatur 38.0 -39.0 °C	Temperatur 39,0-40.0 °C	Temperatur over 40.0 °C indenfor et døgn	Temperatur over 40 .0 °C i mere end 24 timer

Andre bivirkninger: fortæl til lægen