

Hvilke symptomer skal man være opmærksom på efter behandling for brystkræft?

Efter behandling for brystkræft kan følgende symptomer være tegn på **tilbagefald** af sygdommen:

- En ny knude i det opererede bryst eller i det opererede område, hvis brystet er bortopereret
- En knude i det modsidige bryst
- En knude eller en hævet lymfeknude i armhulen
- Langvarig, tør hoste
- Nyopståede knoglesmerter i ryg, skuldre og hofter

Følgende symptomer kan optræde som **en følge af behandlingen**, men kan i sjældne tilfælde også være udtryk for et tilbagefald af kræftsygdommen:

- Smerter lokaliseret til det opererede område
- Betændelse i det opererede bryst eller nærmeste omgivelser
- Hævelse af armen på den opererede side

Du skal generelt være opmærksom på

- Nye symptomer i din krop
- Din krops funktion

Hvis du tror, at de symptomer, du oplever, kan have med din kræftsygdom at gøre eller med den behandling, du har fået, bør du henvende dig til den afdeling, hvor du bliver fulgt. Er du i tvivl, bør du kontakte din praktiserende læge.

Bivirkninger og senfølger efter behandling

Efter operationen skal du efterfølgende eventuelt yderligere have behandling i form af strålebehandling, kemoterapi, antistofbehandling og/eller antihormonbehandling (du skal måske have en kombination af flere behandlinger). I forbindelse med det får du udleveret informationsmateriale, der specifikt vedrører netop den behandling, som du skal gennemgå.

Du bør gemme dette dokument samt det skriftlige informationsmateriale, du modtager. I informationsmaterialet kan du se, hvilke bivirkninger og eventuelle senfølger, du kan få i forbindelse med og efter din behandling. Informationsmaterialet kan du altid rekvirere på DBCG's (Danish Breast Cancer Group) hjemmeside (www.dbcg.dk).