

Navn – CPR. nr.	Start på dosisniveau -1 ved ko-morbiditet og alder > 64 Overvej -1 v. overflade > 2	Dosisniveau	0	-1	-2
		Docetaxel	75 mg/m <sup>2</sup>	60 (80%)	50 (66%)
		Cyklofosfamid	600 mg/m <sup>2</sup>	480 (80%)	396 (66%)

År <input type="text"/>	Uge nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Dag, md.									

		1. serie			2. serie			3. serie			Fortsætte på næste skema for serie 4-6
Højde	cm										
Vægt	kg										
Docetaxel	mg										
Cyklofosfamid	mg										
Ovariel suppression	0=nej, 1=ja										
Vækstfaktor	0=nej, 1=ja										
Zoledronsyre	0=nej, 1=ja										

**Hæmatologisk toksicitet** hvis neutrocytter < 1,5 x 10<sup>3</sup> µl eller trombocytter < 50 x 10<sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Ved febril neutropeni og/eller neutrocytter < 0,5 x 10<sup>3</sup> µl i 3 dage så overvej at reducere dosis 1 niveau (node negative) eller at tilføje vækstfaktor (node positive).

Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl								
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl								
	Hæmoglobin	mmol/L								
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl								

**Ikke-hæmatologisk toksicitet** graderes af patienten<sup>1</sup> ved brug toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes.  
Under uge 0 testes bivirkninger registreret før start af kemoterapi<sup>1</sup> medens bivirkninger registreret efter 1. serie kemoterapi registreres under uge 3 osv.

Febril neutropeni	0 – 4 <sup>1</sup>								
Slimhindeaffektion	0 – 4								
Diarré	0 – 4								
Muskel- og ledsmerter	0 – 4								
Nervepåvirkning	0 – 4								
Hududslæt	0 – 3								
Negleforandringer	0 – 2								
Opkastning	0 – 4								
Kvalme	0 – 4								
Træthed	0 – 4								
Væskeophobning	0 – 3								
Andre (noter i journal)	0 – 4								
Menstruation	0 – 3 <sup>2</sup>								
Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja								

<sup>2</sup> Menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt

Kommentar

Navn – CPR. nr.	Dosisjustering ved toksicitet	Dosisniveau	0	-1	-2
		Docetaxel	75 mg <sup>2</sup>	60 (80%)	50 (66%)
		Cyklofosamid	600 mg/m <sup>2</sup>	480 (80%)	396 (66%)

År <input type="text"/>	Uge nr.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dag, md.										

		4. serie			5. serie			6. serie			
Højde	cm										
Vægt	kg										
Docetaxel	mg										
Cyklofosamid	mg										
Ovariel suppression	0=nej, 1=ja										
Vækstfaktor	0=nej, 1=ja										
Tamoxifen	0=nej, 1=ja										
Letrozol	0=nej, 1=ja										
Zoledronsyre	0=nej, 1=ja										

**Hæmatologisk toksicitet** hvis neutrocytter < 1,5 x 10<sup>3</sup> µl eller thrombocytter < 50 x 10<sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Ved febril neutropeni og/eller neutrocytter < 0,5 x 10<sup>3</sup> µl i 3 dage så overvej at reducere dosis 1 niveau (node negative) eller at tilføje vækstfaktor (node positive).

Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl									
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl									
	Hæmoglobin	mmol/L									
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl									

**Ikke-hæmatologisk toksicitet** graderes af patienten<sup>1</sup> ved brug toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes. Under uge 0 testes bivirkninger registreret før start af kemoterapi medens bivirkninger registreret efter 1. serie kemoterapi registreres under uge 3 osv.

Febril neutropeni	0 – 4 <sup>1</sup>									
Slimhindeaffektion	0 – 4									
Diarré	0 – 4									
Muskel- og ledsmerter	0 – 4									
Nervepåvirkning	0 – 4									
Hududslæt	0 – 3									
Negleforandringer	0 – 2									
Opkastning	0 – 4									
Kvalme	0 – 4									
Træthed	0 – 4									
Væskeophobning	0 – 3									
Andre (noter i journal)	0 – 4									
Menstruation	0 – 3 <sup>2</sup>									
Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja									

<sup>2</sup> Menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt

Kommentar